

Les premiers signes de l'AVC de l'Enfant

Caractéristiques	AVC de l'Adulte	AVC de l'enfant	AVC périnatal
Type les plus fréquents d'AVC	<ul style="list-style-type: none"> • à 80 % causé par l'occlusion d'une artère ou d'une veine cérébrale • à 20 % causé par un saignement dans ou autour du cerveau 	<ul style="list-style-type: none"> • à 50 % causé par l'occlusion d'une artère ou d'une veine cérébrale • à 50 % causé par un saignement dans ou autour du cerveau 	<ul style="list-style-type: none"> • à 80-90 % causé par l'occlusion d'une artère ou d'une veine cérébrale • à 10-20 % causé par un saignement dans ou autour du cerveau
Principaux facteurs de risque et causes de l'AVC	<ul style="list-style-type: none"> • Hypertension • Diabète • Taux élevé de cholestérol • Tabagisme • Arythmie cardiaque (fibrillation auriculaire) 	<ul style="list-style-type: none"> • Malformations congénitales • Pathologies cardiaques • Maladie de la paroi des vaisseaux cérébraux • Infections (ex. méningite) • Traumatisme crânien • Maladies du sang (ex. drépanocytose, anémie, leucémie) • Déshydratation 	<ul style="list-style-type: none"> • La plupart des causes restent inconnues • Malformation cardiaque congénitale • Pathologies placentaires • Troubles de la coagulation • Infections (ex. méningite) • Déshydratation
Signes avant-coureurs et symptômes fréquents	<ul style="list-style-type: none"> • Faiblesse ou engourdissement de la face, du bras ou de la jambe • Troubles de la parole • Troubles de la vision • Mal de tête brutal • Perte de connaissance soudaine 	<ul style="list-style-type: none"> • Troubles de la parole (parole empâtée ou propos inappropriés) ou incapacité de parler • Troubles de la vision • Faiblesse ou engourdissement d'un côté du corps • Mal de tête brutal, souvent accompagné de vomissements en jet • Convulsions • Modifications de la vivacité ou de la capacité à réfléchir clairement • Perte de connaissance, perte d'équilibre, nausées et/ou vomissements accompagnés de certains des autres symptômes • Changement soudain du niveau de vigilance (confusion, baisse de vivacité et/ou difficultés soudaines à rester éveillé) 	<p><u>A la phase précoce :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mouvements répétitifs de la face, de la succion, ou des yeux • Mouvements de pédalage inhabituels • Fixité du regard • Apnées ou pauses respiratoires • Mouvements saccadés et rythmiques (convulsions) des muscles du visage, de la langue, des bras ou des jambes <p><u>Plus tardivement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rigidité de certains groupes musculaires • Secousses rapides et répétées (convulsions) d'un bras, d'une jambe ou de l'ensemble du corps • Latéralisation trop précoce (à moins d'un an, le nourrisson n'a pas habituellement de préférence manuelle droite ou gauche) • Poing souvent fermé ou orteils en griffe d'un côté du corps

Association AVC DE L'ENFANT
 27, rue des Muriers 93460 GOURNAY-SUR-MARNE
 Mail : contact@avcenfant.fr
 Site : www.avcenfant.fr

Centre National de Référence de l'AVC de l'enfant
 MPR pédiatrique - Hôpital Bellevue
 CHU de Saint-Etienne 42055 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2
 Téléphone : 04.77.12.76.13
 Mail : avcenfant@chu-st-etienne.fr